

**CAMPAÑA  
DE  
VACUNACIÓN**



**pacífico**

**VACUNA CONTRA HERPES ZOSTER Y NEURALGIA POST-  
HERPÉTICA**

# ¿Qué es Herpes Zoster?


- Enfermedad infecciosa aguda que afecta a los ganglios nerviosos sensoriales y a sus áreas de inervación.
- Se caracteriza por un dolor intenso a lo largo del recorrido del nervio.
- Aparición de vesículas o ampollas arracimadas en la zona de la piel correspondiente al trayecto del nervio.

# ¿Qué es Neuralgia Post-Herpética


- Después de la cicatrización de las ampollas de herpes zóster, el dolor puede durar meses o años y puede ser intenso. Este dolor del nervio de larga duración se llama neuralgia post-herpética o NPH.

# Casi todos los adultos de 50 años tienen riesgo de herpes zóster, porque han estado expuestos a la varicela<sup>1</sup>

## La edad es el factor de riesgo más importante para herpes zóster<sup>1</sup>



Después de los 50 años, el riesgo y la severidad del herpes zóster aumentan significativamente por el deterioro en la inmunidad relacionado con la edad<sup>3</sup>



► El aumento en la esperanza de vida de la población incluye en el número de casos de herpes zóster.<sup>2,4</sup>

Aproximadamente **1** de cada **3** personas mayor de 50 años sufrirá herpes zóster en algún momento de la vida<sup>1</sup>

Referencias: 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). *MMWR Recomm Rep.* 2008;57(RR-5):1-30. 2. Insinga RP, Itzler RF, Pellissier JM, et al. The incidence of herpes zoster in a United States administrative database. *J Gen Intern Med.* 2005;20(8):748-753. 3. Johnson RW, Bouhassira D, Kassianos G, et al. The impact of herpes zoster and post-herpetic neuralgia on quality-of-life. *BMC Med.* 2010;8(37):1-13. 4. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Population projections, United States, 2004-2030. <http://wonder.cdc.gov/population-projections.html>. Consultado el 22 de agosto del 2012.

# ¿Existe una vacuna para prevenir el Herpes Zóster?

- La vacuna se aplica a mayores de 50 años

VACUNA	DOSIS	INDICACION Y PROTECCION
<b>ZOSTAVAX</b>  LABORATORIO MERCK SHARP & DHOME	Para personas de 50 años en adelante.  1DOSIS	Adultos de 50 años en adelante.  Adultos que ya tuvieron la enfermedad herpes zóster, aplicar 6 meses después de culminado el tratamiento.



**ZOSTAVAX**<sup>®</sup>  
 Zoster Vaccine Live

# Efectos adversos de Zostavax

- Los efectos adversos más frecuentes se pueden producir en el lugar de inyección. Estos efectos adversos incluyen enrojecimiento, dolor, hinchazón, prurito, calor y ardor en el lugar de inyección. También dolor de cabeza.
- Efectos adversos adicionales como: dolor articular; dolor muscular; fiebre; inflamación de ganglios (cuello, axila); erupción; erupción en el lugar de inyección; urticaria en el lugar de inyección; reacciones alérgicas, que pueden ser graves y pueden incluir dificultad para respirar o tragar. Si experimenta una reacción alérgica, llame a su médico inmediatamente.

# Contraindicaciones de Zostavax

- Si es alérgico (hipersensible) al principio activo Neomicina.
- Si tiene trastornos sanguíneos o cualquier tipo de cáncer que debilite su sistema inmune.
- Si su médico le ha informado de que tiene debilitado el sistema inmune como resultado de una enfermedad, medicamentos, u otro tratamiento.
- Si tiene una tuberculosis activa no tratada.
- Si estás embarazada.



**pacifico**